

ZOLEDRONINEZUUR

(ACLASTA®)

Afleveringsvorm

Flacon met 5 mg watervrij zoledroninezuur (= 5,330 mg zoledroninezuur-monohydraat) in 100 ml oplossing voor intraveneuze infusie (concentratie 0,05 mg/ml).

Bereiden

Aclasta is beschikbaar als gebruiksklare oplossing voor infusie.

Zoals voor elke injectie via een glazen flacon is het aan te bevelen een luchtinlaat voor te bereiden, hetzij gebruik makend van een infuus met luchtinlaat, hetzij door een extra luchtinlaat op de stop aan te sluiten.

In geval van infusie via centrale weg, gelieve het infuus na afloop te sluiten om elk risico op lucht in de ader te vermijden.

Toedienen

De oplossing wordt toegediend als een intraveneus infuus van minimum 15 minuten aan een constante infusiesnelheid.

Indien bewaard in de koelkast, moet de oplossing op kamertemperatuur gebracht worden alvorens toe te dienen.

De patiënt aanraden voldoende te drinken voor en na de behandeling (ten minste één of twee glazen) ter preventie van uitdroging.

(meestal 1 maal per jaar toegediend)

Houdbaarheid

Na opening: 24 uur in de koelkast (2°C - 8°C).

De oplossing is uitsluitend voor éénmalig gebruik.

Verenigbaar met (Y-site)

Anidulafungine, daptomycine, oxytocine, tigecycline, mycofenolaat mofetil, octreotide

Onverenigbaar met

Calcium-bevattende oplossingen, ringer lactaat.

Bijwerkingen

Koorts, boezemfibrilleren, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, myalgie, arthralgie, botpijn, rugpijn, pijn in extremiteiten, hypocalciëmie, griepachtige symptomen, rillingen, vermoeidheid, asthenie, pijn, malaise, rigor.

Bronnen

Wetenschappelijke bijsluiter – laatste wijziging 26.09.2008