

ADRENALINE (HCl) Sterop® 0,4 mg/ml

Stofnaam Epinefrine hydrochloride

Klasse Cardiovasculair stelsel – Hypotensie – Middelen bij acute hypotensie

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus als dusdanig of verdund in NaCl 0.9% OF water voor injecties
- IV perfusie NVT

Toedienen

- SC onverdund, voorkeur bij anafylactische shock
- IM onverdund, voorkeur bij anafylactische shock
- IV bolus als dusdanig toedienen of verdund met NaCl 0.9% OF water voor injecties. Verdund eerst helft van de dosis toedienen over 5-10 min.
- IV perfusie NVT

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product koelkast (2°C tot 8°C);
maximaal 6 maanden op kamertemperatuur;
de oplossing niet meer gebruiken indien ze bruin of roze verkleurd is, een neerslag vertoont of niet meer helder is.

Na oplossen NVT

Na verdunnen onmiddellijk gebruiken

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,9%, Hartmann, Ringer

Onverenigbare infusen natriumbicarbonaat, basische oplossingen, geconcentreerde oplossingen

Bijzonderheden

- monitoring van vitale parameters noodzakelijk tijdens toediening.
- pH = 2.2 - 5

Bronnen

1. SKP Adrenaline Sterop® (02/2015)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(01/09/2015)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.