

AUGMENTIN® 2 g/200 mg

Stofnaam Amoxicilline (natrium) + clavulaanzuur (kaliumzout)

Klasse Infecties - Antibacteriële middelen – Bèta-lactamantibiotica - Penicillines

Farmaceutische vorm Poeder voor oplossing voor infusie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 20 ml water voor injectie

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 100 ml NaCl 0,9%

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus langzame intraveneuze injectie gedurende 3 of 4 min.
- IV perfusie gedurende 30 tot 40 min.

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product bewaren beneden 25°C
Na oplossen binnen 20 min gebruiken of verder verdunnen
Na verdunnen 2 uur bij 25 °C

Verenigbare infusen Hartmann

Onverenigbare infusen Glucose 5%, bicarbonaat-oplossingen, dextranen

Bijzonderheden

- Voordat Augmentin® wordt toegediend, dient zorgvuldig nagegaan te worden of de patiënt overgevoelig is voor penicillines, cefalosporines of andere beta-lactamantibiotica.
- Er kunnen convulsies optreden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten die hoge doses krijgen.
- Na oplossing in water voor injectie kan een voorbijgaande roze kleur verschijnen. De oplossing zal daarna weer snel helder worden.
- pH = 8 - 10

Bronnen

1. SKP Augmentin® (09/2013)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Handbook on Injectable Drugs (online, 11/03/2016)
4. Injectable Drugs Guide (2011)

(21/03/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.