

BICLAR® 500 mg

Stofnaam	clarithromycine
Klasse	Infecties – Antibacteriële middelen – Macroliden Neomacroliden

Farmaceutische vorm Poeder voor oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 10 ml water voor injectie

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 250 ml NaCl 0,9% OF 250 ml glucose 5%

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie over 60 minuten

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	beneden 30°C
Na oplossen	24u bij 25°C OF 48u bij 5°C
Na verdunnen	6u bij 25°C OF 48u bij 5°C

Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.
Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in NaCl 0,45%,
Hartmann, Ringer, glucose 5% in Ringerlactaat

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- Bij reconstitutie van het gelyofiliseerde poeder met NaCl 0,9%, lost het product niet op (viskeuze filmvorming)!
- Clarithromycine kan aanleiding geven tot allergische reacties.
- pH = 5

Bronnen

1. SKP Biclar® (10/2015)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Handbook on Injectable Drugs (online, 27/06/2017)
4. Injectable Drugs Guide (2011)

(27/06/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.