

BUSCOPAN® 20 mg/1 ml

Stofnaam	butylhyoscine bromide
Klasse	Gastro-intestinaal stelsel – spasmolytica
Farmaceutische vorm	Oplossing voor injectie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|-----|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NVT |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|---|
| ○ SC | onverdund |
| ○ IM | onverdund |
| ○ IV bolus | onverdund OF verdund tot 10 ml met NaCl 0,9% of glucose 5% (om een langzame toediening mogelijk te maken) |
| ○ IV perfusie | NaCl 0,9% OF glucose 5% |

Toedienen

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| ○ SC | bolus |
| ○ IM | bolus |
| ○ IV bolus | langzaam (3 à 5 min.) |
| ○ IV perfusie | traag, indien onverdund aan 1 ml/min. |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	beneden 25°C
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	geen gegevens

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NaCl 0,9%, glucose 5%

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden - pH = 3,7 – 5,5



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC: A03BB01
CNK: 0027-771

Bronnen

1. SKP Buscopan® (12/2015)
2. Handbook on Injectable Drugs (online)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(10/11/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.