

CEFAZOLINE Sandoz® 1 g

Stofnaam	Cefazoline (natrium)
Klasse	Infecties – antibacteriële middelen – bèta-lactam antibiotica – Penicillines – Cefalosporines

Farmaceutische vorm	Poeder voor oplossing voor injectie of infusie.
----------------------------	---

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|---|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | 4 ml lidocaïne oplossing 0,5% |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | 4 ml water voor injectie OF 4 ml NaCl 0,9 % |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|---|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | onverdund |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | 50 – 100 ml NaCl 0,9 % OF 50 – 100 ml glucose 5 % |

Toedienen

- | | |
|---------------|---|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | in grote spiermassa |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | zowel via intermitterend (30 min. – 60 min.) als continu infuus |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	kamertemperatuur
Na oplossen	24 u bij 2 – 8°C
Na verdunnen	24 u bij 2 – 8°C

Verenigbare infusen	glucose 10%, Ringer, Ringerlactaat, glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in NaCl 0,45%
----------------------------	--

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden	pH = 4,5 - 6
-----------------------	--------------



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK: 0769-691
ATC: J01DB04

Bronnen

1. SKP Cefazoline Sandoz® (02/2015)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Handbook on Injectable Drugs (online, 02/05/2016)

(02/05/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.