Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

CNK: 0756-874
ATC: J01DE01

CEFEPIM Fresenius Kabi® 1 g

Stofnaam Cefepime dihydrochloride

Klasse Infecties – antibacteriële middelen – beta-lactamantibiotica – cefalosporines – vierde groep

Farmaceutische vorm Poeder voor oplossing voor injectie of infusie.

Bereiden

Oplossen met

- SC: NVT
- IM: NVT
- IV bolus: 10 ml water voor injectie OF 10 ml glucose 5% OF 10 ml NaCl 0,9%
- IV perfusie: 10 ml water voor injectie OF 10 ml glucose 5% OF 10 ml NaCl 0,9%

Verder verdunnen met

- SC: NVT
- IM: NVT
- IV bolus: onverdund
- IV perfusie: voeg de gereconstitueerde oplossing (11,4 ml) toe aan water voor injectie OF glucose 5% OF NaCl 0,9%

Toedienen

- SC: NVT
- IM: NVT
- IV bolus: 3 – 5 min.
- IV perfusie: intermittent over 30 min.

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product beneden 25°C beschermd van licht

Na oplossen indien beschermd van licht: 2 u bij kamertemperatuur (20 – 25 °C) OF 24 u in de koelkast (2 – 8°C)

Na verdunnen indien beschermd van licht: 2 u bij kamertemperatuur (20 – 25 °C) OF 24 u in de koelkast (2 – 8°C)

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 10% in NaCl 0,9%, glucose 10%, Ringer, glucose 5% in Ringer

Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden

- Tijdens het bewaren kan de oplossing van kleur veranderen (van kleurloos naar geelbruin) zonder invloed te hebben op de kracht van het product.
- pH = 4 – 6.

Bronnen

1. SKP Cefepime Fresenius Kabi® (09/2015)
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 02/05/2017)
3. Uptodate (online, 02/05/2017)

(02/05/2017)

DISCLAIMER
Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.