

CEFTRIAZONE Mylan® 1 g

Stofnaam	natriumceftriaxon
Klasse	Antibacteriële middelen – Cefalosporines – Derde groep

Farmaceutische vorm Poeder voor oplossing voor injectie.

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM 3,5 ml lidocaïne hydrochloride 1%
- IV bolus 10 ml water voor injectie
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Toedienen

- SC NVT
- IM Diep in de bovenste buitenkwadrant van de bil injecteren, niet meer dan 1 g aan dezelfde zijde injecteren.
- IV bolus in 2 tot 4 min. injecteren
- IV perfusie NVT

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	kamertemperatuur
Na oplossen	3 uur bij 18 tot 25 ° C
Na verdunnen met	NVT

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,45%, glucose 5% in NaCl 0,9%

Onverenigbare infusen calciumhoudende IV-oplossingen, Ringer, Hartmann

Bijzonderheden Bij gebruik van lidocaïne als oplosmiddel mag de verkregen oplossing nooit intraveneus worden toegediend.

pH = 6 - 8



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK 2216-497
ATC J01DD04

Bronnen

1. SKP Ceftriaxone Mylan® (06/2014)
2. Handbook of injectable medicines (online, 27/05/2016)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(27/05/2016)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.