



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK: 0764746
ATC: J01MA02

CIPROXINE® 400 mg/200 ml

Stofnaam ciprofloxacin

Klasse Antibacteriële middelen - chinolonen - fluoroquinolonen

Farmaceutische vorm 400 mg/200 ml oplossing voor infusie

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie onverdund; 400 mg over 60 min.

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product kamertemperatuur (15-25°C), beschermen tegen licht;
neerslag bij koele bewaar temperatuur lost terug op bij
kamertemperatuur;
na aanprikken 24u houdbaar beneden 25°C.

Na oplossen met NVT

Na verdunnen met NVT

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden.

Verenigbare infusen glucose 10%, glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in
NaCl 0,45%, Hartmann, Ringer, Ringerlactaat



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

CNK: 0764746
ATC: J01MA02

Onverenigbare infusen natriumbicarbonaat

Bijzonderheden pH = 3,5 – 4,5

Bronnen

1. SKP Ciproxine® (09/2013)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Handbook on Injectable Medicines (online, 29/09/2015)
4. Injectable Drugs Guide (2011)

(29/09/2015)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.