

CLAMOXYL® 1g

Stofnaam	Amoxicilline
Klasse	Infecties – antibacteriële middelen – Beta-lactamantibiotica – Penicillines – Aminopenicillines
Farmaceutische vorm	Poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Bereiden	
Oplossen met	
○ SC	NVT
○ IM	2.5ml lidocaïnehydrochloride
○ IV bolus	20 ml water voor injectie en goed schudden
○ IV perfusie	20 ml water voor injectie en goed schudden
Verder verdunnen met	
○ SC	NVT
○ IM	NVT
○ IV bolus	NVT
○ IV perfusie	100 ml infusievloeistof (NaCl 0.9%)
Toedienen	
○ SC	NVT
○ IM	Max. per keer 1 g injecteren (bij kinderen: Max. 60mg/kg)
○ IV bolus	Over 3 – 4 minuten
○ IV perfusie	Infusie van 20 – 30 minuten
Houdbaarheid/Bewaarcondities	
Product	Bewaren beneden de 25 °C
Na oplossen	Tot maximaal ½ uur na reconstitutie gebruiken
Na verdunnen	6 uur (in NaCl 0.9%), 1 uur (in gluc 5%) bij kamertemperatuur

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.
--

Verenigbare infusen

NaCl 0.9%, Ringer lactaat, Glucose 5%

Onverenigbare infusen

Infusen van dextraan, infusen van bicarbonaat, vetemulsies, Amikacine, ciprofloxacin, gentamycine, midazolam, tobramycine

Bijzonderheden

-

Bronnen

1. SKP Clamoxyl, 01/2018
2. Handbook of Injectable Medicines (2010)

(19/04/2019)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.