

CORDARONE® 150mg/3ml

Stofnaam Amiodaron, hydrochloride

Klasse Cardiovasculair stelsel – Antiarritmica – Antiarritmica bij supraventriculaire en ventriculaire aritmieën

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie voor intraveneus gebruik

Bereiden

Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus onverdund (bij ventriculaire fibrillatie: 20ml glucose 5%)
- IV perfusie 250ml glucose 5% (minimumconcentratie: 150 mg amiodarone/250ml glucose 5%)

Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus niet minder dan 3 min., minimum 15min. wachten voor volgende toediening
- IV perfusie over 20min – 2uren (2 à 3 x per dag)

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product kamertemperatuur, ter bescherming tegen licht. Niet in de koelkast bewaren.

Na oplossen met NVT

Na verdunnen met onmiddellijk te gebruiken

Verenigbare infusen glucose 5%

Onverenigbare infusen NaCl 0,9%

Bijzonderheden

Wanneer mogelijk via centrale lijn toedienen. Indien geen centrale lijn toegankelijk, dan via een grote perifere vene.

Het gebruik van medisch materiaal dat plastificerende middelen bevat zoals DEHP (di-2-ethylhexylftalaat) in aanwezigheid van een oplossing amiodaron kan leiden tot diffusie van DHEP in deze oplossing.

pH = 4

Bronnen

1. SKP Cordarone (03/06/2015)
2. UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Injectable Drugs Guide (2011)

(22/05/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.