

FLAGYL® 500 mg/100 ml

Stofnaam	metronidazol
Klasse	Infecties – Antiparasitaire middelen – Andere antiprotozoaire middelen – Nitro-imidazoolderivaten
Farmaceutische vorm	Heldere, lichtgele oplossing voor infusie.

Bereiden

Oplossen met

- | | |
|---------------|-----|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NVT |

Verder verdunnen met

- | | |
|---------------|-----|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | NVT |

Toedienen

- | | |
|---------------|-----------------------|
| ○ SC | NVT |
| ○ IM | NVT |
| ○ IV bolus | NVT |
| ○ IV perfusie | 100 ml per 20 minuten |

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product	Bewaren ter bescherming tegen licht, beneden 25°C
Na oplossen	NVT
Na verdunnen	24 uur op kamertemperatuur

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

Verenigbare infusen NaCl 0.9%, Glucose 5%

Onverenigbare infusen

Bijzonderheden - pH = 4,5 - 7



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers

ATC: J01XD01
CNK:0897-405

Bronnen

1. SKP Flagyl® (12/2016)
2. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
3. Handbook on Injectable Drugs (online)

(24/11/2017)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.