

GENTAMYCINE Hexal® SF 80 mg/2 ml

Stofnaam Gentamicine sulfaat

Klasse Infecties –Antibacteriële middelen – Aminoglycosiden

Farmaceutische vorm oplossing voor injectie

Bereiden

Oplossen met

- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT
- SC NVT
- IM NVT

Verder verdunnen met

- IM NVT
- SC NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie 50-100ml NaCl 0,9% OF 50-100 ml glucose 5%

Toedienen

- IM onverdund
- SC NVT
- IV bolus over 2 tot 5 minuten
- IV perfusie over 30 tot 60minuten

Houdbaarheid/Bewaarcondities

Product kamertemperatuur

Na oplossen met onmiddellijk te gebruiken

Na verdunnen met onmiddellijk te gebruiken

Verenigbare infusen glucose 5% in NaCl 0,9%, glucose 5% in NaCl 0,45%, glucose 10%, Ringerlactaat

Onverenigbare infusen natriumbicarbonaat

Bijzonderheden pH = 3 – 5,5

Aanpassing aan nierfunctie nodig!

Ook subconjunctivale toediening mogelijk.

Bronnen

1. SKPGentamycine (01/2015)
2. Handbook on Injectable Drugs (online, 21/03/2016)
3. The UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide (third edition, 2010)
4. Injectable Drugs Guide (2011)
5. Up to date (online, 21/03/2016)
6. Clinical pharmacology (online, 21/03/2016)
7. Firma Hexal AG (22/03/2016)

(21/03/16)

DISCLAIMER

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.